

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DUNLEY SIMETICONA 200 MG COMPRIMIDOS

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA BAJO RECETA

Lea esta información detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 10 días, debe consultar a un médico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué es DUNLEY y para qué se utiliza?

DUNLEY contiene Simeticona una medicación antiflatulenta, es decir, destruye las burbujas de gas digestivo que causan hinchazón facilitando su eliminación. Está indicada en todos los procesos que cursan con disconfort abdominal debido a un exceso de gas en el sistema gastrointestinal en adultos y adolescentes a partir de 12 años. También está indicado para la preparación del tubo digestivo para procedimientos endoscópicos, radiográficos o ecográficos.

¿Qué necesita saber antes de empezar a usar DUNLEY?

Antes de usar DUNLEY

No use DUNLEY si

- Presenta íleo (oclusión intestinal) de cualquier causa.
- Hipersensibilidad a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes.

Tenga especial cuidado con DUNLEY

Toma simultánea de otros medicamentos:

Informe a su médico que está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. DUNLEY no interfiere habitualmente con la absorción de otros medicamentos sin embargo, la absorción de Levotiroxina (medicamento usado en el



MA 104 versión 00

tratamiento de enfermedades y disfunciones de la glándula tiroidea) puede verse afectada si al mismo tiempo se administra Simeticona por lo que la toma de preparados con Levotiroxina y preparados con Simeticona debe separarse al menos 4 horas.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos:

DUNLEY no afecta la capacidad de conducción de vehículos.

¿Cómo usar DUNLEY?

En adultos y niños mayores de 12 años la dosis recomendada es de 1 comprimido 2 a 3 veces por día. Para niños menores de 12 años se recomienda utilizar la forma farmacéutica en gotas.

Embarazo y lactancia

DUNLEY puede utilizarse durante el embarazo o la lactancia ya que la Simeticona actúa solo a nivel intestinal sin modificarse ni absorberse.

Uso en niños

En niños entre 6 y 12 años se recomienda 1 comprimido 2 veces por día.

Uso apropiado del medicamento DUNLEY

Cuando se utiliza DUNLEY en la preparación para procedimientos diagnósticos (endoscopias, radiografías o ecografías) se recomienda tomar 2 comprimidos, 2 a 3 veces por día desde dos días antes al procedimiento y 2 comprimidos por la mañana justo antes del procedimiento.

Si toma más DUNLEY de lo que debería:

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada. En caso de una ingestión accidental o ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
Hospital General de Agudos J. A. Fernández: (011) 4808-2655.
Hospital de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330-160.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

A tener en cuenta mientras toma DUNLEY

Efectos indeseables (adversos)

- Trastornos gastrointestinales: náuseas y estreñimiento
- Trastornos del sistema inmunológico: erupción cutánea, prurito, edema de cara y lengua, dificultad respiratoria.

Comunicación de efectos adversos:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o

farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través de la página web de ANMAT <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

¿Cómo conservar DUNLEY?

Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C en su envase original. Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y blister.

PRESENTACIONES

Envases conteniendo: 10, 20 y 30 comprimidos.

¿Dónde puedo obtener más información?

- Su médico o farmacéutico le puede dar más información acerca de DUNLEY, ó
- Comuníquese con Rossmore Pharma al teléfono 4574-4455 o por mail: info@rossmore.us

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llamar a ANMAT responde 0800-333-1234 o llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>"

Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con otros, y use este medicamento sólo para la condición por la que fue recetada.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Especialidad Médica autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado No. 60.367

Rossmore Pharma S.A.

José Cubas 3351 - C.A.B.A.

Tel. 011- 4574-4455 // www.rossmore.us // info@rossmore.us

Dirección Técnica: María Viviana Abalde - Farmacéutica

Elaborado en: Tres Arroyos 1829, C.A.B.A.

Última revisión: Junio 2025



FOTOPOLÍMEROS
FLEXOGRAFÍA - OFFSET SECO
PREPrensa - PACKAGING

Fecha: 11/08/25

Cliente: Rossmore Pharma S.A.

Proyecto: Dunley

Descripción: Prospecto PIL Impreso

Medidas: 180 x 120

Versión: 0

Pasaje Enrique de Vedia 2038 - Dto 1 - C.A.B.A. - Tel.: (011) 5060-8128 - e-mail: rc@prepress.com.ar

